

Nombre comercial: AGRI POTASIO
 Grupo: Fertilizante
 Tipo Corrector: Nutricional
 Formulación: Concentrado Soluble
 Modo de Acción: Foliar y Radicular
 Comercializado por Agriventures Spa.



Composición (P/V)



Especificaciones:

Complejado 100% como citrato de potasio
 Densidad: 1,48 g/ml
 pH: 7 - 8
 Conductividad: 1 mS
 Metales pesados: As, Pb, Cd y Hg < 1 mg/L
 Solubilidad a 20°C: 100 %

Características del Producto

AGRI POTASIO contiene alta concentración de potasio complejado con ácidos cítricos en forma orgánica, es un líquido claro, libre de impurezas y libre de cloruros.

AGRI POTASIO aplicado durante la etapa de floración y cuaja como potasio, es rápidamente absorbido.

AGRI POTASIO es usado para mejorar la calidad de la fruta, el tamaño y aumentar la productividad.

Mejora la resistencia a enfermedades de la planta, reduce la alcalinidad del suelo lo que crea un medio adecuado para la absorción de otros nutrientes, se puede aplicar mediante riego por goteo y aplicación foliar.

Recomendación de Cultivos y Dosis

Cultivo	Dosificación		Tiempo de Aplicación	N° Aplicaciones
	Fertirrigación	Foliar cc/ha		
Paltos	10 - 20 L / ha	200-350	Realizar varias aplicaciones según lo recomiende el asesor, hasta 35 días antes de cosecha	Recomendación de asesor
Limonos, Naranjos, Mandarinos, Pomelos, Tangelos, Clementinas	8 - 15 L / ha	200 - 300	Crecimiento en primavera realizar entre 1 a 2 aplicaciones y durante el crecimiento de frutos, con intervalos de 10-14 días.	2-3
Cerezos, Ciruelos, Nectarines, Duraznos, Almonds, Avellano, Olivo	8 - 15 L / ha	200 - 300	A partir del endurecimiento del carozo, repitiendo cada 10 - 12 días.	2-3
Manzanos, Perales, Membrillos, Nogales	8 - 15 L / ha	200 - 300	Desde fruto con desarrollo, cada 7 - 10 días	2-3
Kiwis	5-10 L / ha	200 - 300	Partir de 6 a 8 semanas de caída de pétalos y repetir, si es necesario, con intervalos de 10 - 14 días.	3-4
Arándanos, Frambuesas, Frutillas	8 - 15 L / ha	200 - 300	Durante el crecimiento de los frutos, repetir cada 9 - 12 días	2-3
Espárragos	8 - 15 L / ha	200 - 350	Inicio de brotación, a inicio del 2º brote y 25 días antes del último riego para chapoda	1-2
Hortalizas y Cucurbitáceas	10-20 L / ha	200 -300	Etapa de desarrollo y maduración	1-2

Almacenamiento

Mantener alejado del contacto directo con luz solar. Almacenar en un lugar seco y sin humedad.

Evitar variaciones intensas de temperatura.

Es preferible almacenar a una temperatura entre 7-30°C, de otra manera la forma física del producto podría cambiar. Sin embargo, esto no afecta la eficiencia del producto ni sus propiedades químicas.

Consejos para un Buen Manejo

Producto preparado para su aplicación foliar y radicular. En aplicación foliar se puede mezclar con la mayoría de fitosanitarios, en caso de duda hacer una prueba previa. En cítricos y frutales es aconsejable aplicar después de caída de pétalos.

Agriventures solo se responsabiliza de las cualidades físicas y químicas del producto, no se hace responsable por mal uso del producto o daños que pueda ocasionar por acciones distintas a las indicadas.

Importador: Agriventures Spa., Santiago - Chile.

www.Agriventures.cl

Ventas@Agriventures.cl

